

Guía de referencia para la suspensión de medicamentos

Pautas para pacientes de Lubbock – 22nd Street y Lubbock – Quaker Ave

Antihistamínicos y antiácidos

La siguiente es una lista de medicamentos que afectan la prueba cutánea de alergia y que deben suspenderse según se detalla a continuación antes de realizar la prueba. Si no está seguro acerca de alguno de sus medicamentos, puede llamar a la farmacia o a nuestro centro.

- Revise todos sus medicamentos, incluidos los de venta libre y los auxiliares para dormir, para asegurarse de que no contengan ninguno de los siguientes productos.
- A continuación se enumeran los nombres genéricos con ejemplos de nombres comerciales entre paréntesis.
- Esta no es una lista exhaustiva debido a los continuos avances en medicina; por lo tanto, revise cuidadosamente sus medicamentos.

No aplique esteroides tópicos en la espalda durante 1 mes previo a la prueba. También recomendamos suspender todos los suplementos herbales una semana antes de la prueba.

Antihistamínicos: suspender dos semanas antes de la prueba

- Clemastina (Dayhist)
- Ciproheptadina (Periactin)
- Doxylamine (Sleep Aid)
- Hidroxizina (Vistaril, Atarax) (Suspender 8 días antes de la prueba)
- Meclizine (Antivert, Dramamine Less Drowsy)
- Proclorperazina (Compazine)

Antihistamínicos: suspender siete días antes de la prueba

- Todos los auxiliares para dormir a base de antihistamínicos (NyQuil, Unisom)
- Todos los medicamentos para resfriado/sinusitis/gripe o PM (Advil PM, TheraFlu, Tylenol PM)
- Acrivastina (Semprex-D)
- Bromfeniramina (Dimetapp, Bromfed)
- Carboxinamina (Karbinal ER, RyVent)
- Cetirizina (Zyrtec)
- Difenhidramina (Dramamine, Benadryl)
- Desloratadina (Clarinex)
- Dexclorfeniramina (RyClora)
- Fexofenadina (Allegra)
- Levocetirizina (Xyzal)
- Loratadina (Alavert, Claritin)
- Prometazina (Phenergan, Promethegan)
- Triprolidina (Histex)

Antiácidos H2 (comúnmente utilizados para el reflujo): suspender tres días antes de la prueba

- Cimetidina (Tagamet)
- Famotidina (Pepcid, Zantac 360)
- Nizatidina (Axitid)

Gotas oftálmicas para alergia: suspender tres días antes de la prueba

- Alcaftadina (Lastacraft)
- Azelastina (Optivar)
- Bepotastina (Bepreve)
- Epinastina (Elestat)
- Ketotifeno (Zaditor, Alaway)
- Olopatadina (Patanol, Pazeo)
- Feniramina (Naphcon-A, Opcon-A, Visine-A)

Aerosoles nasales: suspender tres días antes de la prueba

- Azelastina (Astelin, Astepro, Dymista)
- Olopatadina (Patanase, Ryaltris)

Algunos medicamentos para el estado de ánimo, como los antidepresivos tricíclicos y las benzodiacepinas, pueden afectar las pruebas cutáneas, pero NO suspenda estos medicamentos sin antes consultarlos con el médico que los prescribe y con nuestra clínica.

Otros medicamentos que deben suspenderse antes de la prueba. NO los suspenda sin hablarlo antes con el médico que los prescribe:

Suspender tres días antes de la prueba

- Bupropión (Wellbutrin)
- Desipramina (Norpramin)
- Eszopiclona (Lunesta)
- Trazodona (Oleptro)
- Zolpidem (Ambien)

Suspender siete días antes de la prueba

- Alprazolam (Xanax)
- Amitriptilina (Limbitrol, Elavil)
- Clonazepam (Klonopin)
- Diazepam (Valium)
- Doxepina
- Lorazepam (Ativan)
- Midazolam (Versed)
- Mirtazapina (Remeron)
- Nortriptilina (Pamelor)
- Quetiapina (Seroquel)
- Temazepam (Restoril)

Otros medicamentos que se deben suspender: suspender catorce días antes de la prueba

- Imipramina (Tofranil)
- Protriptilina (Vicactil)
- Surmontil (trimipramina)

Suplementos herbales: suspender cinco días antes de la prueba

- Astrágalo
- Matricaria
- Té verde
- Regaliz
- Cardo mariano
- Palma enana americana
- Hierba de San Juan